
JOURNEE DE LA SMV 30 mai 2008


Causes des rapatriements aux âges « extrêmes » lors de voyages à l'étranger




















30/05/2008




































































LES DELAIS et DESTINATIONS

7.2 jours en moyenne

→ Extrêmes: du jour même à J + 32

40 % ré-hospitalisés à l'arrivée







CONCLUSION

Les problèmes médicaux, causes des transports des jeunes de 0 à 15 ans et des personnes de plus de 65 ans, sont bien sûr différents, les accidents étant plus nombreux chez les jeunes et les maladies plus fréquentes chez les aînés.



ASSISTANCE

30/05/2008

35

EN RESUME

Les rapatriements des plus de 65 ans :

- -Très grande majorité d'Europe et d'Afrique (dont Maghreb 81%)
- -Les accidents à type de chutes représentent 64 % des causes de la traumatologie et les problèmes cardio, neuro, gastro-intestinaux et pneumo 61 % des problèmes médicaux.
- -Retour à 45 % avec un accompagnement médical ou paramédical
- -Délai de 7 jours
- -Vers leur domicile (60 %)







Outre la pathologie présentée, il est très important de tenir compte du plateau technique local, des possibilités logistiques, de l'âge, des antécédents et du degré d'autonomie pour choisir la date, le moyen de transport adapté, ainsi que la nécessité ou non de prévoir un accompagnement médical ou paramédical.







Désolé docteur, mais je dois encore vous contredire !

36

Il est certain que **l'existence des compagnies d'assistance** est un des facteurs **rassurant les personnes** sur le fait de **partir en voyage**, même avec des pathologies pré-existantes importantes.

Un regret :nous déplorons que des personnes porteuses de pathologies très lourdes ou récentes, parfois avec l'accord de leur médecin traitant, choisissent des voyages dans des régions reculées et/ou ayant peu de ressources médicales.







37

