ETUDE MULTICENTRIQUE RETROSPECTIVE SUR LA PRATIQUE VACCINALE CONTRE LES IIM

La vaccination
parlons-en franchement !

JOURNEES D'AUTOMNE DE LA SMV LIMOGES 21 OCTOBRE

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

1

Parcours vaccinal obligatoire de 0 à 2 ans :

4 vaccins
6 RDV
10 injections
11 maladies évitées

6 rendez-vous – 10 injections

2
mois

4
mois

5
mois

11
mois

12
mois

16-18
mois

Plus de **70%**
des enfants en France
sont déjà vaccinés
contre ces 11 maladies.

contre 11 maladies aux conséquences graves.

 Poliovirus Paralyse, décès	 Coqueluche Détresse respiratoire, décès	 Diphtérie Asphyxie, décès
 Tuberculose Paralyse, décès	 Oreillons Méningite, atteintes testiculaires	 Rougeole Encéphalite, pneumonie, décès
 Rubéole Malformations fœtales	 Pneumocoque Méningite, Handicap, décès	 Méningococque C Méningite, amputations, décès
 Hépatite B Cirrhose, cancer	 Hémophilus influenzae b Méningite, décès	

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

2

La politique vaccinale en France¹

Calendrier des vaccinations 2023

Mise en œuvre de la politique vaccinale

- État (départements, collectivités territoriales, : région, département, centres de vaccination hospitaliers, centres de vaccination agréés)
- Secteur libéral (médecin, sage-femme, pharmacien, infirmier)

Politique vaccinale annuelle définie par le Ministre chargé de la santé

HAS

Commission Technique des Vaccinations
Avis Haut Conseil de la santé publique

Évaluation du rapport
bénéfice / risque

Surveillance
épidémiologique

La vaccination, un processus dynamique : il faut s'adapter...

1. Groupe Avancées Vaccinales, Impact des programmes de vaccination généralisée de l'enfant en France au XX^e siècle. La revue du praticien 2010; 20:1044-8

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'auteur et présenté sous sa responsabilité.

3

Vaccination : êtes-vous à jour? 2023 calendrier simplifié des vaccinations

Âge approprié	Vaccinations obligatoires pour les nourrissons							6 ans	11-13 ans	14 ans	25 ans	45 ans	65 ans et +
	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	11 mois	12 mois						
BCG	■												
DTP		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Tous les 10 ans
Coqueluche		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Hib		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Hépatite B		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Pneumocoque		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ROR						■	■						
Méningocoque C					■	■	■						
Rotavirus		■	■	■	■	■	■						
Méningocoque B			■	■	■	■	■						
HPV								■	■	■	■	■	
Grippe													Tous les ans
Zona													■

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'auteur et présenté sous sa responsabilité.

4

Calendrier des vaccinations et recommandations

En ligne :

<https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal>

Vérifier la version en ligne sur le site du M Santé et prévention.

Impact négatif de la Covid-19 sur les programmes de vaccination (France, Monde).

SUPPORT DU COURS dans <https://www.chru-strasbourg.fr/vaccinations/>

Nourrissons Enfants Adolescents

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Vaccins contre :	Naissance	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11-13 ans	15 ans	16-18 ans
Diphthérie (D), Tétanos (T), coqueluche acellulaire (Ca), Poliomyélite (P)		DTCaP		DTCaP		DTCaP			DTCaP			
Haemophilus influenzae b (Hib)		Hib		Hib		Hib						
Hépatite B (Hep B)		Hep B		Hep B		Hep B						
Pneumocoque (PnC)		PnC		PnC		PnC						
Rotavirus		Rota	Rota	± Rota ²								
Méningocoque C (vaccin conjugué MnC)					MnC		MnC					
Méningocoque B ¹			MnB		MnB		MnB					
Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)							ROR 1	ROR 2				
Diphthérie (D), Tétanos (T), coqueluche acellulaire (ca), Poliomyélite (P) ²										dTcaP		
Papillomavirus humains (HPV) chez jeunes filles										2 doses (0,6 mois) : vaccin nonvalent* (11/14 ans)		
Hépatite B									3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou, de 11 à 15 ans révolus, 2 doses selon le schéma 0, 6 mois ³			
Méningocoque C (vaccin conjugué)									1 dose jusqu'à 24 ans ⁴			
Papillomavirus humains (HPV) chez jeunes filles et jeunes garçons											3 doses selon le schéma 0, 2, 6 mois vaccin non-valent (15 à 19 ans révolus)	
Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)											2 doses à au moins 1 mois d'intervalle si pas de vaccin antérieur ; 1 dose si une seule dose vaccinale antérieure	

Les vaccins indiqués sur fond bleu sont obligatoires pour les enfants depuis le 1er janvier 2018. Encadrés verts : co-administration possible.

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'éditeur et présenté sous sa responsabilité.

		Vaccins contre :	Naissance	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans	11 - 13 ans	15 ans	16 - 18 ans
Populations particulières et à risque	Tuberculose (BCG)	1 dose recommandée dès l'âge de 1 mois sauf situation particulière ⁷												
	Grippe	1 dose annuelle si personne à risque ⁸ , à partir de l'âge de 6 mois												
	Hépatite A	2 doses selon le schéma 0, 6 mois si exposition à des risques particuliers ⁹ , à partir d'un an												
	Hépatite B	Nouveau-né de mère Ag HBs positif ¹⁰ 3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois												
	Méningocoque B (si risque particulier) ¹¹	A partir de 2 ans : 2 doses espacées d'un mois Un rappel est recommandé tous les 5 ans en cas de risque continu d'exposition												
	Méningocoque ACYW (si risque particulier) ¹²	De 6 semaines à 5 mois : 2 doses espacées d'au moins 2 mois et rappel à 12 mois avec un intervalle de 2 mois après la 2 ^{ème} dose (Nimenrix [®]) De 6 à 12 mois : 1 dose et rappel à 12 mois avec un intervalle de 2 mois après la 2 ^{ème} dose (Nimenrix [®]) Après 12 mois : 1 dose unique de Nimenrix [®] ou de MenQuadri [®] (ou Menveo [®] après 2 ans) Un rappel est recommandé tous les 5 ans en cas de risque continu d'exposition ¹³												
	Pneumocoque	Prématurés et enfants à risque ¹⁴ : 1 dose de PhC à 2, 3 et 4 mois et rappel à 11 mois												
		Si à risque, entre 24 et 59 ¹⁵ : N'ayant jamais reçu de VPC 13 : 2 VPC 13 espacés de 2 mois, puis VPP 23 au moins 2 mois après le dernier VPC Ayant reçu un VPC13 avant l'âge de 2 ans : 1 dose de VPC 13												
		Si risque à partir de 5 ans ¹⁶ : Non vaccinés antérieurement : VPC13 puis VPP23 (S8) Vaccinés antérieurement : Avec la séquence VPC13-VPP23 : VPP23 avec un délai d'au moins 5 ans après le dernier VPP23 Vaccinés depuis plus de 1 an avec le VPP23 : VPC13. Revaccination par VPP 23 avec un délai d'au moins 5 ans par rapport au dernier VPP 23												
	Varicelle	2 doses chez des enfants contacts de personnes à risque ou candidats à une greffe ¹⁷												
	2 doses chez adolescents ¹⁸ de 12 à 18 ans sans antécédent et sérologatifs (sérologie facultative)													

7

		Vaccins contre :	18-24 ans	25 ans	35 ans	45 ans	65 ans	> 65 ans
Recommandations générales	Diphthérie (d), Tétanos (T), Poliomyélite (P)			Rappel dTcaP ¹ ou dTP si dernier rappel de dTcaP < 5 ans		Rappel	Rappel	Rappel à 75, 85 ans...
	Coqueluche acellulaire (ca)						1 dose annuelle	
	Grippe						Entre 65 à 74 ans : une dose ²	
	Zona							
Rattrapage	Coqueluche acellulaire (ca)			1 dose dTcaP chez l'adulte jusqu'à 39 ans révolus, n'ayant pas reçu de rappel à 25 ans				
	Méningocoque C		1 dose ³					
	Papillomavirus humains (HPV) chez les jeunes femmes et les jeunes hommes		3 doses selon le schéma 0, 1, 6 mois ou 0, 2, 6 mois (jeunes jusqu'à l'âge de 19 ans révolus)					
	Rougeole (R), Oreillons (O), Rubéole (R)		Atteindre 2 doses au total chez les personnes nées depuis 1980					
Populations particulières et à risque	Rubéole		1 dose de ROR chez les femmes non vaccinées en âge de procréer					
	Coqueluche acellulaire (ca)		Femmes enceintes entre 20 et 36 semaine d'aménorrhée En l'absence de vaccination de la femme enceinte pendant la grossesse, stratégie de cocooning ⁴ : personnes non vaccinées depuis l'enfance ou pour les adolescents ou adultes de moins de 25 ans dont la dernière injection remonte à plus de 5 ans : 1 dose de dTcaP ⁵ . Pour les personnes antérieurement vaccinées à l'âge adulte et à nouveau en situation de cocooning, revaccination si la dernière dose de vaccin coquelucheux date de plus de 10 ans (délai minimal d'un mois entre 1 dose de dTP et 1 dose de dTcaP)					
	Grippe		1 dose annuelle si risque particulier ⁶					
	Hépatite A		2 doses selon le schéma : 0, 6 mois si exposition à un risque particulier ⁸					
	Hépatite B		3 doses selon le schéma : 0, 1, 6 mois si exposition à un risque particulier ⁹ . Pour certains cas particuliers, cf. infra ⁸					
	Méningocoque ACYW (conjugué)		1 dose au contact d'un cas en cas de risque particulier ¹⁰ . Un rappel est recommandé tous les 5 ans en cas de risque continu d'exposition					
	Méningocoque B ¹¹		En cas de risque particulier : Bexsero: 2 doses espacées d'un mois ou Trumenba en schéma 2 doses (à 6 mois d'intervalle) ou 3 doses (2 doses à 1 mois d'intervalle suivie d'une dose au moins 4 mois après la seconde dose) Un rappel est recommandé tous les 5 ans en cas de risque continu d'exposition					
	Pneumocoque		Pour les adultes à risque élevé d'infection invasive à pneumocoque ¹ , voir les différents schémas vaccinaux et tableau (paragraphe 2.11)					
	Varicelle		2 doses ¹² si risque particulier					
	Fièvre jaune		1 dose pour les résidents du département de la Guyane ou les personnes issues de la métropole qui y séjournent ou souhaitent s'y rendre sauf cas particuliers cf. chap 2.4 ¹³					
Papillomavirus humains (HPV)		Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (MSM) jusqu'à 26 ans						

8

Chez le nourrisson : Vacciner dès 8 semaines de vie pour protéger tôt

- 8 sem de vie DTCaP Hib HB (1^{ere}) + VPC13 (1^{ere})
- 3 mois Méningocoque B (1^{ere})
- 4 mois DTCaP Hib HB (2^e) + VPC13 (2^e)
- 5 mois Méningocoque B (2^e)
Meningocoque C (1^{ere})

Primovaccination
Diphthérie
Tétanos
Polio
Coqueluche
Hib
Hépatite B
+ Pneumocoque

Primovaccination contre les IIM B et C

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'assureur

9

Pourquoi un RDV vaccinal Méningo C à 5 mois depuis 2017 ?

Un échec de la vaccination en médecine générale depuis 2010 !

- ❖ *Neisseria meningitidis*, principalement de sérogroupes A, B, C, W et Y.
- ❖ Cause importante de **morbidité et mortalité**.
- ❖ **Transmission interhumaine** par les sécrétions rhino-pharyngées lors de contacts proches. La transmission est favorisée dans le foyer familial ou les conditions de vie en collectivité
- ❖ Séquelles définitives dans **10 à 20 %** des cas :
 - **nécrose cutanée** (10 %) avec ou sans amputation
 - **déficit du neuro-développement** (7 %)
 - **surdité** (4 % des cas),
 - d'épilepsie, de troubles visuels...

- ❖ La **létalité** était de **12 %** en France parmi les cas d'IIM survenus en **2017**.
- ❖ En France : la vaccination contre la **méningite C** est **obligatoire chez les nourrissons** depuis le 1er janvier 2018 et recommandée chez les 2-24 ans non vaccinés. La vaccination contre les **méningites A, B, C, W, Y** est **recommandée dans certains cas** (populations à risque, aspléniques, voyageurs, au-contact d'un cas...).

Photographe Anne GEDES

<https://professionnels.vaccination-info-service.fr/Maladies-et-leurs-vaccins/Meningites-et-septicemies-a-meningocoques> consulté le 09/09/2020

10

Zoom sur les infections invasives à méningocoque en France en 2019

Taux de notification des IIM selon le sérotype, France entière

Sérotype	Nbre de cas (%)	Nbre de décès
B	240 (53%)	16 (7%)
C	54 (12%)	7 (13%)
Y	54 (12%)	7 (13%)
W	93 (21%)	25 (27%)
X,E ou autre	8 (2%) dont 7 cas de X	
Total	459 dont 449 avec un sérotype	55 (12%)

→ *Purpura fulminans* : 92 (20%)
25% pour les IIM B, 13% pour les IIM C, 19% pour les IIM W et 7% pour les IIM Y (p=0,02).
→ Taux de séquelles précoces : **5% (24 cas)**

SPF
Les infections invasives à méningocoques en 2019
Centre national de référence des IIM, données 2019, avec l'aimable autorisation du Pr M.Taha, Institut Pasteur Paris

Nourrissons et jeunes enfants :
les plus à risque d'IIM

Incidence des IIM selon l'âge

Focus chez les 0-4 ans

Sérotype B : > 70% des cas

	IIM (tous sérotypes)		IIM B		IIM C		IIM W		IIM Y	
	Nb de cas	Nb de décès	Nb de cas	Nb de décès	Nb de cas	Nb de décès	Nb de cas	Nb de décès	Nb de cas	Nb de décès
<1 an	65	6 (9%)	45	1 (2%)	1	-	13	4 (31%)	4	1
1-4 ans	62	4 (6%)	43	2 (5%)	2	-	12	2 (17%)	2	-
			88 cas de B		3 cas de C		25 cas de W		6 cas de Y	

11

2016 : les infections invasives à méningocoque C ne diminuent pas chez les enfants avant 1 an en raison d'une CV trop faible

Pourcentage de personnes vaccinées contre les infections invasives à méningocoque C

Age	24 mois	3-9 ans	10-14 ans	15-19 ans	20-25 ans
Au 31/12/2016	70,9%	65,5%	35,7%	25,5%	10,1%

Taux de notifications des infections invasives à méningocoque C - France entière, 2006-2016

Entre 2011 et 2016 :
806 infections invasives à Men C – 97 décès

Paediatric and perinatal Epidemiology : France 2009-2014,
25% des décès et 25% des séquelles graves auraient été évités par la simple application du calendrier vaccinal

Recos depuis 2017 : 1 dose à l'âge de 5 mois et 2^e dose à 12 mois
Rattrapage* : 1 dose jusqu'à l'âge de 24 ans

* Si non vacciné

<http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Couverture-vaccinale/Donnees/Meningocoque-C>, accédé le 07/02/2018
Dossier pédagogique – Elargissement de l'obligation vaccinale à 11 maladies – 7 juillet 2017
Dossier pédagogique – Vaccination: la protection collective - 19 octobre 2017
Dossier de presse du 5 janvier 2018 : 11 vaccinations indispensables, obligatoires au 1er janvier 2018, Santé Publique France

12

Analyse des couvertures vaccinales chez les enfants après une année d'obligation vaccinale

Couvertures vaccinales des enfants nés au premier trimestre 2018 comparativement à la couverture vaccinale des enfants nés au premier trimestre 2017

L'analyse des couvertures vaccinales à partir des données de remboursement des vaccins de l'Assurance maladies montre **une augmentation, des couvertures vaccinales** pour tous les vaccins des enfants nés en 2018 par rapport à ceux nés en 2017.

Synthèse du premier bilan annuel des obligations vaccinales du nourrisson - décembre 2019 - https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_du_rapport_2019.pdf consulté le 07 09 2020

Impact de la vaccination sur le nombre de cas/ incidence des infections invasives à méningocoque C - nourrissons < 1 an

Nombre de cas d'IIMC en fonction de la couverture vaccinale chez les < 2 ans

Taha S. et al. 2022 *nj Vaccines* (2022) 7:73 | <https://doi.org/10.1038/s41541-022-00488-8>

SPF - Bulletin de santé publique. Vaccination - AVRIL 2019. <https://afpa.org/content/uploads/2018/04/Bulletin-de-SPF-avril-2019.pdf> (consulté en septembre 2019)

Nombre de cas d'IIM, France

- Baisse importante des IIMC (en nombre et en proportion) et en particulier chez les nourrissons (un seul cas chez les nourrissons <1 an, non vaccine)
- Augmentation des IIMB et des IIMW (en nombre et en proportion).

Evolution d'IIM en France 2017-2021

Deghmane and Taha Microorganisms 2022

15

Age et distribution des sérogroupes d'IIM, France (2019)

* No. of cases: The highest numbers are among seniors ≥60 years

Evolution des cas d'IIM par mois et par séro groupe : France 2017-2022

16

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

Evolution d'IIM en France avant pendant et après la pandémie COVID-19

17

Evolution d'IIM en France avant pendant et après la pandémie COVID-19

18

RECOMMANDER
 LES BONNES PRATIQUES

RECOMMANDATION
VACCINALE

Stratégie de vaccination pour la prévention des infections invasives à méningocoques : Le sérotype B et la place de BEXSERO®

Document n'ayant pas fait l'objet d'une relecture orthographique et typographique

Document de travail - 20 janvier 2021

Janvier 2021

La HAS demande aux sociétés savantes de se positionner sur la place du vaccin Bexsero
 La HAS propose dans un rapport de 156 pages un statu quo sur la vaccination/ recos de 2013

Mars 2021

Réponse attendue des sociétés savantes : opposition unanime contre l'avis de la HAS

3 Juin 2021

La HAS recommande dans un nouveau rapport de 130 pages la vaccination de tous les nourrissons, qui représentent la classe d'âge la plus vulnérable à ces IIM B, en utilisant BEXSERO® selon le schéma de l'AMM.

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'éditeur et présenté sous sa responsabilité.

19

EVOLUTION DE LA POSITION DE LA HAS BEXSERO, une expérience mondiale

Approuvé dans 42 pays⁴

Intégré dans le calendrier vaccinal de 7 pays^{5,6,7} : Italie, Royaume-Uni, Irlande, Andorre, Lituanie, Portugal²⁴ et République Tchèque²⁵

Recommandé pour les nourrissons par 17 organismes de santé, dont le JCVI (Royaume-Uni), l'ATAGI (Australie) et le SBIM (Brésil)⁷⁻²³

Plus de 52 millions de doses distribuées dans le monde⁴

→ L'utilisation du vaccin BEXSERO dans le cadre d'une stratégie généralisée de prévention des IIM B en France n'est pas recommandée et pas remboursable, elle doit être effectuée en suivant les recommandations officielles.

4. Données internes GSK, 2020 ; 5. ECDC Vaccine Scheduler <https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu> - consulté en Janvier 2020. 6. Andorre ; 7. Lituanie ; 8. Australie ; 9. Autriche ; 10. Brésil ; 11. République Tchèque ; 12. Grèce ; 13. Hongrie ; 14. Pologne ; 15. Royaume-Uni ; 16. Chypre ; 17. Espagne ; 18. Belgique ; 19. Portugal ; 20. Israël ; 21. Irlande ; 22. Italie ; 23. Canada ; 24. Portugal ; 25. République Tchèque.

Review

Recent advances in meningococcal B disease prevention: real-world evidence from 4CMenB vaccination

Federico Martínón-Torres^{4,1}, Angelika Banzhoff^{2,2,*}, Chiara Azzari^{3,3}, Philippe De Wals^{4,4}, Robin Marlow^{5,5}, Helen Marshall^{6,6}, Mariagrazia Pizza^{6,7}, Rino Rappuoli^{6,7}, Rafik Bekkat-Berkani^{8,8}

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'éditeur et présenté sous sa responsabilité.

20

21

22

Réponses du Conseil National Professionnel de la Pédiatrie au projet de recommandation vaccinale

Vaccin sûr et efficace

- **Schéma souhaité : 2+1 (3-5-13 mois)**
 - Maladie rare mais **incidence + élevée dans la petite enfance**
 - Poids individuel et collectif **lourd et sous-estimé**
 - L'absence de recommandation accentue les **inégalités sociales**
- **Efficacité - tolérance démontrée par les études**
 - Protection croisée vis-à-vis des **IIMW**
 - Vies humaines et qualité de vie **épargnées par la vaccination**
- **Rareté de la maladie**
 - Cf. épidémiologie du méningo B : fréquence, incidence 20x/ grands enfants et 5x/1-4 ans
 - **Morbi-mortalité non négligeable**
- **Poids de la maladie et coût**
 - **Séquelles au long cours** : neurologiques, orthopédiques, psychologiques, développements...
 - Largement **sous-estimées** et génératrices de dépenses à long terme non prises en compte (évaluation médico-économique difficile)
- **Inégalités sociales**
 - **Les enfants de familles défavorisées sont les plus à risque**

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'auteur et présenté sous sa responsabilité.

23

Pribil C et al. Poster 22èmes Journées Nationales d'Infectiologie - 30/08-01/09 2021 - Montpellier, France

24

Prévention des IIM B pour les nourrissons (AMM à partir de 2 mois) Remboursement pour les enfants de 0-2 ans et si FR

Age de la 1 ^{ère} dose	Primo vaccination	Intervalle entre les doses de primovaccination	Rappel
Nourrissons de 2 à 5 mois ^a			1 dose^{b,c} entre 12 et 15 mois avec un intervalle ≥ 6 mois entre primovaccination et dose de rappel
Nourrissons de 6 à 11 mois	2 doses	≥ 2 mois	1 dose^c Au cours de la 2^{ème} année avec un intervalle ≥ 2 mois entre primovaccination et dose de rappel
Enfants de 12 à 23 mois			1 dose^c avec un intervalle de 12 et 23 mois entre primovaccination et dose de rappel
A partir de 2 ans*	2 doses	≥ 1 mois	Selon les recommandations officielles, une dose de rappel tous les 5 ans peut être envisagée chez les sujets présentant un risque continu d'exposition à infection méningococcique

Vaccination contre le méningocoque de sérotype B

La vaccination contre les IIM de sérotype B par Bexsero[®] est recommandée chez l'ensemble des nourrissons selon le schéma suivant : première dose à l'âge de 3 mois, deuxième dose à 5 mois et dose de rappel à 12 mois (M3, M5, M12).

Une dose = 0,5 ml de suspension. (a) La première dose ne doit pas être administrée avant l'âge de 2 mois. La sécurité et l'efficacité de Bexsero chez les nourrissons de moins de 8 semaines n'ont pas encore été établies. Aucune donnée n'est disponible. (b) En cas de retard, la dose de rappel ne doit pas être administrée au-delà de l'âge de 24 mois. (c) La nécessité et le moment d'administration d'une dose de rappel n'ont pas encore été déterminés. *Il n'existe aucune donnée chez les adultes de plus de 50 ans.

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'éditeur et présenté sous sa responsabilité.

25

Chez le nourrisson : Vacciner ROR à 12 mois de vie

- 11 mois DTCaP Hib HB (R)

- + VPC13 (R)

Doses de rappel

- Diphtérie
- Tétanos
- Polio
- Coqueluche
- Hib
- Hépatite B

+ Pneumocoque

- 12 mois
ROR (1^{ère})
Méningocoque C* (R)
Méningocoque B (R)

* Utiliser à 1 an le même vaccin qu'à 5 mois

- 16-18 mois
ROR (2^e)

Dose de rattrapage

Document scit. le l'éditeur et présenté sous sa responsabilité.

26

Haut
Conseil de la
Santé
Publique

Avis et Rapport 2012

+ Ré-actualisation 7 novembre 2014
+ Avis du HCSP du 10 mars 2017
+ Calendriers vaccinaux 2013-2020
+ RCP des vaccins

Vaccinations des personnes immunodéprimées ou aspléniques

Recommandations

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

27

PATIENT ASPLENIQUE OU HYPOSPLENIQUE

- **IIM ACYW**

Age	Recommandations vaccinales selon l'âge d'exposition
6 sem – 11 mois	Nimenrix® : 2 doses à 2 mois d'intervalle, rappel 12 mois après
> 12 mois, enfant et adulte non vacciné	Nimenrix® ou Menveo® (à partir de 24 mois) : 2 doses à 6 mois d'intervalle puis rappel tous les 5 ans

- **II *Haemophilus influenzae* type b**

Age	Recommandations vaccinales selon l'âge d'exposition
Nourrisson	M2 M3 M4 M11
6-12 mois	Si non vacciné : 2 doses M0M2 + rappel dans la 2 ^e année (min 2 après 2 ^e dose)
12 mois – 5 ans	Si non vacciné : 1 dose
> 5 ans, enfant et adulte	Non antérieurement vacciné : 1 dose Act Hib® (hors AMM)

28

PATIENT ASPLENIQUE OU HYPOSPLENIQUE

- **IIM B^{1 2}** (en rouge = modifications selon RCP Juin 2018 RCP Mai 2020 ; en bleu = modification 2021)

Age	Recommandations vaccinales selon l'âge d'exposition	
2 – 5 mois	Bexsero® M0 M2 (de préférence aux 3 ^e et 5 ^e mois de vie) et rappel entre 12 et 15 mois	
6 – 11 mois	2 doses à 2 mois d'intervalle et rappel au cours de la 2 ^e année (au moins 2 mois après la primovaccination)	
12 – 23 mois	2 doses à 2 mois d'intervalle et rappel 12 à 24 mois après	
≥ 2 ans et adultes	2 doses à 1 mois d'intervalle et rappel chez les sujets présentant un risque continu d'exposition à infection méningococcique	1 Pas de vaccination systématique sauf recommandation particulière dont asplénie 2 Situations spécifiques notamment épidémique et d'hyperendémie

- **IIP : PCV13 (M0) + PPV23 (M2) + PPV23 (M60)**
- **Grippe : vaccin tétravalent tous les ans**

! Protocoles vaccinaux : - Splénectomie programmée : **au plus tard 15 jours avant**
 - Splénectomie en urgence : **au plus tôt 15 jour après l'intervention**

Pas de contre-indication aux vaccins vivants.

Les rappels tétanos comme pour les immunocompétents à âge fixe : 25-45-65-75-85-95 ans ...

Prévention paludisme +++ si voyage en zone impaludée

29

GREFFE CELLULE SOUCHE HEMATOPOIETIQUE

Perte de LT et LB induisant un déficit immunitaire prolongé.

La reconstitution immunitaire est lente (CD8 puis CD4)

Déplétion CD4 sévère et prolongée si greffe allogénique, selon âge du receveur, type et âge du donneur et présence de réaction du greffon contre l'hôte (GVH).

Les LB, absents pendant 3 mois, voire 6 si ttt par Rituximab, se reconstituent en 1 an. Les AC contre les pathogènes rencontrés avant la greffe persistent 6 - 12 mois. En post greffes les nx AC nécessitent 1 an.

Les greffes entraînent une diminution/disparition des AC dirigés contre les maladies infectieuses à prévention vaccinale.

BCG, vaccin Grippe vivant⁽¹⁾ et Rotavirus⁽²⁾ sont CI chez les greffés (et ⁽¹⁻²⁾ CI dans l'entourage)

MOIS post-greffe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Pn13			Pn13	Pn13	Pn13							Pn23 ou 13**															
Pn23																											
Grippe inactivé			(G)*	(G)*		G																					
HIB						HIB	HIB	HIB										HIB									
DTCaP						DTCaP	DTCaP	DTCaP										DTCaP									
HB						HB	HB	HB										HB									
Méningo conjugués												ACYW B	B	B				ACYW									
ROR																								B			
HPV						HPV		HPV				HPV															
Varicelle																									V		V
FJ																									FJ ****		

* possible dès 3 mois si situation épidémique (nosocomiale ou communautaire) ** vaccin Pn13 en cas de cGVH chronique *** si pas de cGVH et ttt immunosuppresseur arrêté depuis au moins 3 mois **** si séjour zone d'endémie

30

Etude multicentrique rétrospective sur la pratique vaccinale contre les IIM

- Consultation de pèlerins pour La Mecque

Oui autant	Oui moins	Non

- Consultation voyageur VFR au Sénégal 15 jours en décembre

Vaccine	En parle	N'en parle pas	Au cas par cas

- Consultation voyageur balnéaire au Burkina Faso 15 jours en décembre

Vaccine	En parle	N'en parle pas	Au cas par cas

- Consultation étudiant au long cours en ASIE

Vaccine	En parle	N'en parle pas	Au cas par cas

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'auteur et présenté sous sa responsabilité.

33

Etude multicentrique rétrospective sur la pratique vaccinale contre les IIM

- Consultation étudiant en soins infirmier en juillet et août au Sénégal

Vaccine	En parle	N'en parle pas	Au cas par cas

- Consultation étudiant en Université aux USA pendant 1 an

Vaccine	En parle	N'en parle pas	Au cas par cas

- Consultation étudiant en école de commerce pendant 6 mois en Amérique du SUD

Vaccine	En parle	N'en parle pas	Au cas par cas

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'auteur et présenté sous sa responsabilité.

34

Etude multicentrique rétrospective sur la pratique vaccinale contre les IIM

- **Vaccin utilisé dans les CVI**
 - **Nimenrix**
 - **Menveo ...**
- **Tarif appliqué dans les CVI**
 - **Prix moyen**
 -
- **Tarif CPAM des vaccins méningo ACYW**
 - **41 €**
 - **Bonne réponse**
- **Autre indication hors voyage des vaccins méningo**
 - **Asplénie, GCS, déficit en properdine, ttt anti C5a (ecalizumab SOLIRIS, ravuluzimab (Ultomiris)**

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

35

Etude multicentrique rétrospective sur la pratique vaccinale contre les IIM

- **EVOLUTION ATTENDUE SUR LES VACCINS CONTRE LES IIM et PRATIQUES EN CVI**
 -
 -

Document scientifique réservé à l'usage exclusif de l'orateur et présenté sous sa responsabilité.

36