


ENQUÊTE NATIONALE SMV 2005 / 2012
CENTRES DE VACCINATION INTERNATIONALE

Sandra LEULIER¹, Juliette PATRIOT¹, Sandrine VALLEE¹, Jean-Philippe LEROY¹
Ludovic de Gentile², Christophe HOMMEL³, Claude HENGY⁴
1 CVI de Rouen - 2 CVI d'Angers - 3 CVI Strasbourg - 4 CVI de Lyon

Strasbourg – 5 octobre mars 2012



MÉTHODOLOGIE - 1

- × Entretiens téléphoniques
- × Effectués au nom de la SMV

**Réalisés par les mêmes intervenants:
résultat sur la base des résultats obtenus
sur un premier appel (44 fiches)**

MÉTHODOLOGIE-2



× Nombre de centres : 156 centres métropolitains

× **Base utilisable : 145 centres**


+ 8 CVI agréés ne fonctionnent toujours pas

+ 3 CVI à statuts particuliers

➤ **+ 21 CVI depuis 2005**

SMV-Commission Recherche 2005


TYPOLOGIE DES INTERLOCUTEURS DE PREMIÈRE INTENTION





RÉPARTITION TERRITORIALE & STRUCTURES

DÉPARTEMENTS N'AYANT PAS DE CVI EN 2005





VACCINATIONS



ENCEPHALITE JAPONAISE

- ✘ En 2012, **33 %** des CVI ne peuvent toujours pas vacciner contre l'encéphalite japonaise qui ne peut être réalisée que dans les Centres de Vaccinations alors que le vaccin dispose maintenant d'une AMM.
- ✘ Chiffre stable entre 2005 et 2012 (ATU en 2005)



- ✘ Méningites : l'interlocuteur contacté ne peut le plus souvent pas indiquer si le centre dispose
 - + encore du vaccin A/C polysidique ??
ou
 - + d'un vaccin quadrivalent ACYW135 non conjugué
et/ou
 - + du vaccin quadrivalent conjugué ACYW135



HÉPATITE A

- ✘ 28 % des centres de vaccination internationale agréé pour réaliser la vaccination fièvre jaune, ne disposent toujours pas de vaccin contre l'hépatite A.
- ✘ Ils n'ont le plus souvent pas d'autre vaccin que la fièvre jaune : DTP Coqueluche, Rougeole OR, Typhoïde,



ROUGEOLE

- ✘ Dans 1/3 des cas comment font-ils pour vacciner leur interlocuteur qui aurait besoin d'un rattrapage ?
- ✘ Existe t-il une perte de chance ?
 - + Qu'elle règle concernant la vaccination avec un produit extérieur au CVI est suivie ?

Exemple de la recommandation de compléter le schéma vaccinale de la rougeole pour que les personnes nées après 1981, aient reçu 2 doses.



Journal of
TRAVEL MEDICINE

76

ORIGINAL ARTICLES

Quality of Travel Health Advice in a French Travel Medicine and Vaccine Center: A Prospective Observational Study

Marie-Anne Bouldouyre, MD, Nathalie Colin De Verfière, MD, Juliette Pevie, MD, Nathalie De Castro, MD, Diane Ponscarne, MD, Samia Hamane, MD, Anne Rachline, MD, Samuel Ferret, MD, and Jean-Michel Molina, MD

Department of Infectious Diseases, Hôpital Saint-Louis, Paris, France

DOI: 10.1111/j.1798-8305.2011.00591.x





FORMATIONS, ENSEIGNEMENTS



- ✘ 15 % de nos interlocuteurs savait que le centre participait à des FMC, EPU
- ✘ 40 % déclarait que personne du centre n'avait cette activité.
 - + Il n'y a pas de responsable du CVI spontanément désigné par les premiers interlocuteurs



L'enquête nécessite d'être complétée...